

Tabla 2. Distribución de casos y controles según variables relacionadas con el hábito de fumar.

Variables	Casos	Controles	RD	IC 95%	Interpretación
Cantidad de cigarrillos o tabacos diarios					
No fuma	66	62	1,00	–	–
Menos de 10 cigarros	10	13	0,72	1,74 - 0,30	p>0,05 (Protección)
De 10 a 19 cigarros	4	6	0,63	2,19 - 0,18	p>0,05 (Protección)
20 cigarros o más	15	17	0,83	1,78 - 0,39	p>0,05 (Protección)
1 tabaco (puro)	5	1	4,70	29,52 - 0,76	p>0,05 (Causal)
De 2 a 4 tabacos	1	2	0,47	3,66 - 0,06	p>0,05 (Protección)
5 tabacos o más	1	1	0,94	9,27 - 0,10	p>0,05 (Protección)
Tiempo que lleva fumando					
No fuma	66	62	1,00	–	–
Menos de 1 año	1	–	–	–	–
De 1 a 5 años	6	5	1,13	3,69 - 0,35	p>0,05 (Causal)
Más de 5 años	29	35	0,78	1,41 - 0,43	p>0,05 (Protección)

IC, intervalo de confianza; RD, razón de disparidad

Tabla 3. Distribución de casos y controles según variables relacionadas con la ingestión de sal.

Variables	Casos	Controles	RD	IC 95%	Interpretación
Ingestión de Sal					
Si	95	92	1,48	3,93 - 0,55	p>0,05 (Causal)
No	7	10	1,00	–	–
Cantidad de sal consumida diariamente					
Ninguna	7	10	1,00	–	–
6 gramos/día o menos	56	55	1,45	3,98 - 0,53	p>0,05 (Causal)
Más de 6 gramos/día	39	37	1,51	4,25 - 0,59	p>0,05 (Causal)
Tiempo de Consumo de sal					
No consume sal	7	10	1,00	–	–
Menos de 10 años	3	6	0,71	3,54 - 0,14	p>0,05 (Protección)
De 10 a 20 años	6	5	1,71	7,47 - 0,39	p>0,05 (Causal)
Más de 20 años	86	81	1,52	4,06 - 0,57	p>0,05 (Causal)

IC, intervalo de confianza; RD, razón de disparidad